

AVAX dc

Dispersiyon Konsantre DC



Doğal Solventli
İlk ve Tek Larvasit



AVAX

dc

Dispersiyon Konsantre DC

%10 Pyriproxyfen



İçerik


Aktif Maddenin Miktarı ve Adı

% 10 Pyriproxyfen (saf) a/h

Yardımcı Maddenin Miktarı ve Adı

%15 Emülgatör

%75 Turpentine Oil (Çam yağı)



Etki Mekanizması


Pyriproxyfen bir gençlik hormonu (Juvenil Hormon Analog) olup, zararlının genç döneminde yüksek seviyede bulunan ve erginleşmeye doğru azalan gençlik hormonu yerine geçerek bu hormonu taklit eder

Uygulama larva evresinde yapılır ve larval evreler tamamlandıktan sonra pupa evresinde ölür. Uygulamadan **8-14 gün** sonra pupa ölümlerinin görülmesi ile ürün etkinliği gerçekleşmiş olur.

Dikkat ediniz

- ! Yeterli doz uygulayınız.
- ! Larva döneminde ölüm beklemeyiniz.
- ! Uygulama alanlarından numune alınız.
- ! Pupa döneminde ölümleri uygulamadan **8-14 Gün** sonra takip ediniz.
- ! Pupa dönemlerinde ölüm göremediğin durumlarda üretici ile iletişime geçiniz.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■





Sivrisinekler

Avax DC temiz,kirli ve organik atıkça zengin çok kirli sularda sivrisinek larvalarına karşı kullanılır.

Sivrisinekler yılda 5-10 döl verirler türüne göre değişmekle birlikte bir sivrisinek dişisi,bir defada, 200-300 yumurta bırakabilir.

Yumurtaların açılması 1-2 gün sürer, yumurtadan larva sonuna kadar olan period 7-15 gün arasındadır. Sivrisineklerin yumurta-larva-pupa evreleri sucul ortamlarda, ergin evreleri ise karasal ortamda bulunurlar.




Karasinekler


Avax Dc ile çöp konteynırları,çöplükler gübrelikler ve diğer karasinek üremesine elverişli organik atıkların ilaçlanması karasinek kontrolünde başarıyı arttıracaktır. Çöp konteynırlarındaki çöpün günlük arınmasına rağmen dip kısmındaki birkaç santimlik balçık/çamurumsu tabakada binlerce karasinek larvası bulunmaktadır.

Bundan dolayı konteynırların dip kısmına ulaşacak şekilde yapılan Avax DC uygulaması hedef alandaki karasinek larva problemini sonlandıracaktır.

Sivrisinek yaşam döngüsü



Karasinek yaşam döngüsü





Kullanılacak Zararlı Organizmalar

Sivrisinek ve Karasinek Larvaları

Kullanma Talimatı

Hedef Zararlı	Uygulama Alanı	Uygulama Şekli	Uygulama Oranı	Uygulama Dozu
Sivrisinek Larvası	Göl, Gölet Temiz Sular	Sprey	1 lt ürün+999 lt su 1 ha alana 100 lt karışım	10 g al/ha
Karasinek Larvası	Gübrelikler Organik Atıklar Çöplükler	Sprey	100 ml ürün+60 lt su 1m2 alana 3 lt karışım	0,05 g al/m2

! AVAX DC; Sivrisinek Üreme Alanlarında 30 Gün,
Karasinek Üreme Alanlarında 30 Gün Etkinliğini Korumaktadır.

Kullanma Şekli

Sivrisinek Larva Mücadelesinde; 1 litre AVAX DC 999 L su ile seyreltilerek elde edilen karışım hektara 100 litre karışım gelecek şekilde uygulanır.

Karasinek Larva Mücadelesinde; 1 litre AVAX DC 1.999 L su ile seyreltilerek elde edilen karışım metrekaareye 1 litre karışım gelecek şekilde uygulanır.

